


*SUR UN LÉZARD NOUVEAU, PROVENANT DE L'EST AFRICAIN BRITANNIQUE,  
APPARTENANT À LA FAMILLE DES SCINCIDÉS,*

PAR M. F. ANGEL.

*Lygosoma Gromieri*, nov. sp.

Corps allongé, cylindrique. Membres relativement faibles et courts. La longueur du membre postérieur est contenue presque trois fois dans la distance comprise entre l'aisselle et l'aîne; elle égale la longueur contenue entre le bout du museau et le membre antérieur. La longueur de celui-ci est com-



*Lygosoma Gromieri*, nov. sp.

Tête vue par la face dorsale, grossie 4 fois environ.

Tête vue latéralement, grossie 4 fois environ.

prise une fois trois quarts dans la distance comprise entre sa base et le bout du museau. Museau arrondi, un peu plus long que l'ouverture de l'œil. Paupière inférieure écailleuse, semi-transparente. Cinq doigts et cinq orteils, tous armés de griffes. Pas de *canthus rostralis*. Ouverture de l'oreille petite, à peine plus grande que la narine, montrant deux ou trois lobules écailleux en haut et en bas. Supra-nasales présentes, formant une suture médiane derrière la rostrale. Celle-ci est grande; sa portion visible d'au-

dessus est aussi longue que les supra-nasales. Pas de fronto-nasale. Préfrontales petites, rejetées sur le côté. Frontale aussi longue que les fronto-pariétales et interpariétale ensemble, largement en contact, en avant, avec les supra-nasales, et, sur les côtés, avec la première et la deuxième sus-oculaires. Quatre sus-oculaires, les deux premières plus grandes que les autres. Cinq ou six supra-ciliaires, sub-égales. Fronto-pariétales distinctes, plus grandes que l'interpariétale. Une paire de nuchales, et une assez grande temporale, de chaque côté. Cinq labiales supérieures, les troisième et quatrième situées en dessous de l'œil; la cinquième est la plus grande. 24 écailles lisses, entourant le milieu du corps. Deux plaques pré-anales légèrement agrandies. Queue manquante. Doigts courts, le troisième est le plus long. Orteils plus allongés que les doigts; 12 ou 13 lamelles sous le quatrième orteil.

*Coloration.* — Parties supérieures, brun jaunâtre clair, parsemé de petites taches plus foncées qui semblent indiquer des lignes longitudinales, peu précises et interrompues. Les plaques de la tête sont serties, par places, de brun plus foncé. La partie supérieure des côtés du corps montre aussi des traces de lignes longitudinales formées par les taches marquant chacune des écailles. Face ventrale uniformément blanc jaunâtre.

#### DIMENSIONS.

Distance du bout du museau à l'anus.....	40	millimètres.
Longueur de la tête.....	10	—
Longueur du membre antérieur.....	11	—
Longueur du membre postérieur.....	18	—
Largeur du corps.....	9	—
Ouverture de l'oreille.....	0,8	—

Un exemplaire provenant du Tsavo district (Afrique orientale anglaise).  
Donateur : D<sup>r</sup> Gromier (1912).

Cette espèce, que je classe dans le sous-genre *Riopa*, est voisine de *L. Kutuensis*<sup>(1)</sup>, Lönnberg (p. 17). Elle forme, avec celle-ci, parmi les *Lygosoma* de l'Est africain, un type particulier caractérisé par l'absence de fronto-nasale, alliée à la présence de supra-nasales et de nuchales. Sa possession de 5 doigts aux membres antérieurs (au lieu de 4), de 24 écailles autour du milieu du corps, de membres postérieurs plus courts, la différencie principalement de *Lygosoma Kutuensis*.

<sup>(1)</sup> *Kungl. Svenska Vetenskapsak. Handl. Band 47, n° 6. Swedish zool. Exp. to Brit. E. Africa, 1911. Rept. and fishes.*